

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	JVF alcohol reforzado 70º
Forma farmacéutica:	Solución tópica
Fortaleza:	-
Presentación:	Frasco de PEBD con 125, 250, 500 o 1000 mL cada uno.
Titular del Registro Sanitario, país:	INILAB S.L., MADRID, ESPAÑA.
Fabricante, país:	LABORATORIOS BETAMADRILEÑO S.L., MADRID, ESPAÑA.
Número de Registro Sanitario:	028-17D3
Fecha de Inscripción:	9 de marzo de 2017
Composición:	
Cada 100 mL contiene:	
Cloruro de benzalconio	0,1 g
Etanol 70º c.s.p	100,0 mL
Plazo de validez:	60 meses
Condiciones de almacenamiento:	No requiere condiciones especiales de almacenamiento.

Indicaciones terapéuticas:

Para limpieza y antisepsia de piel sana.

Bactericida, no eficaz frente a esporas.

Contraindicaciones:

No procede.

Precauciones:

No debe emplearse junto con detergentes aniónicos.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

Líquido y vapores muy inflamables. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

Manténgase el recipiente herméticamente cerrado y en lugar bien ventilado.

Uso externo, no ingerir.

La aplicación repetida del producto puede producir sequedad o formación de grietas en la piel. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel ni durante un tiempo prolongado.

Utilizar con precaución en niños menores de 2 años.

Irrita los ojos. Evítese el contacto con los ojos, mucosas o zonas sensibles de la piel. En caso de contacto, aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

Manténgase fuera del alcance de los niños, y lejos de alimentos y bebidas.

En raros casos que se produzca irritación de la piel o alergia debe suspenderse la aplicación

Efectos indeseables:

No procede

Posología y método de administración:

Aplicar sobre piel sana, limpia y seca, con un algodón, con las manos correctamente limpias, en cantidad suficiente en la zona a tratar y dejar durante 2-3 minutos.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No debe emplearse junto con detergentes aniónicos

Uso en Embarazo y lactancia:

No procede

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede

Sobredosis:

No procede

Propiedades farmacodinámicas:

No procede

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No procede

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 31 de marzo de 2017.