

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	Novo-Dermoquinona al 10% (Mequinol)
Forma farmacéutica:	Pomada
Fortaleza:	10%
Presentación:	Estuche por un frasco de vidrio ámbar con 20 g.
Titular del Registro Sanitario, país:	LABORATORIOS JUVENTUS S.A., España.
Fabricante, país:	B. BRAUN MEDICAL S.A.S., España.
Número de Registro Sanitario:	053-14D3
Fecha de Inscripción:	13 de agosto de 2014.
Composición:	
Cada 100 g contiene:	
Mequinol	10,0 g
Plazo de validez:	60 meses
Condiciones de almacenamiento:	No requiere condiciones especiales de almacenamiento.

Indicaciones terapéuticas:

Lentigo generalizado. Pecas.

Hiperpigmentaciones, bien por perfumes u otros agentes fotosensibilizantes o las asociadas a la enfermedad de Addison, así como las aparecidas después de inflamaciones de la piel, traumatismos (heridas, quemaduras, tratamientos abrasivos).

Cloasma (melasma), manchas de café con leche, y, en general, todas las afecciones pigmentarias melanodérmicas, como hiperchromías debidas a dermatosis, psoriasis, liquen plano, etc.

Tratamiento del vitiligo, asociado con el empleo de Psoralen (7-H-furo(3-2g)(I) benzopiran-7-ona) por vía oral, con lo que se logran reducir al mínimo los contrastes crómicos, que son los que dan lugar a los aspectos antiestéticos

Contraindicaciones:

No se han descrito.

Precauciones:

No se presenta.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

La exposición a la luz solar de las zonas tratadas con Novo-Dermoquinona debe evitarse hasta pasadas unas horas de su aplicación.

Efectos indeseables:

No se han descrito.

Debe comunicar a su médico o su farmacéutico cualquier reacción adversa que no estuviese descrita en el prospecto.

Posología y método de administración:

Aplicar la Novo-Dermoquinona sobre la zona a tratar tres veces al día, verificando un masaje con el producto para que penetre convenientemente. Generalmente se precisan varios meses para conseguir el efecto buscado, aun cuando al final del primer mes se empiecen a notar los resultados. Si pasaran cuatro meses sin modificar la hiperpigmentación, debe renunciarse al tratamiento

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

No se conocen interacciones y no se han descrito incompatibilidades

Uso en Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No procede.

Sobredosis:

No se ha constatado con el uso de Novo-Dermoquinona ningún caso de intoxicación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar con el Servicio de Información Toxicológica.

Propiedades farmacodinámicas:

El mecanismo exacto de la acción blanqueante de la piel de mequinol es desconocido; sin embargo, es un sustrato de la tirosinasa, así que podría ser un inhibidor competitivo de la formación de los precursores de la melanina. Por esto no daña a los melanocitos, a diferencia de la hidroquinona.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

No se ha descrito.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

No procede.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 13 de agosto de 2014.