

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	LECHE MAGNESIA PHILLIPS® ORIGINAL
Forma farmacéutica:	Suspensión oral
Fortaleza:	8,50 g/100mL
Presentación:	Frasco de PEAD con 60 mL, 120 mL ó 360 mL.
Titular del Registro Sanitario, país:	ASPEN CARICAM S.A., San José, Costa Rica.
Fabricante, país:	ASPEN MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Ciudad de México, México.
Número de Registro Sanitario:	M-18-023-A02
Fecha de Inscripción:	29 de marzo de 2018
Composición:	
Cada 100 mL contiene:	
Hidróxido de magnesio*	8,50 g*
* Se adiciona un 3,12 % de exceso	
Plazo de validez:	36 meses
Condiciones de almacenamiento:	Almacenar por debajo de 30 °C.

Indicaciones terapéuticas:

Laxante, antiácido. Alivia el estreñimiento, agruras, malestar estomacal, acidez e indigestión.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a componentes de la fórmula.

Precauciones:

Precaución en pacientes con insuficiencia renal, obstrucción intestinal y/o demás estados dolorosos e inflamatorios del aparato digestivo.

Advertencias especiales y precauciones de uso:

No tomar en caso de dolor abdominal, vómitos, náuseas, embarazo o lactancia.

Descontinúe si hay diarrea. No tomar como laxante por más de 3 días seguidos o como antiácido por más de 14 días seguidos. Como cualquier laxante puede crear hábito.

Tome suficiente agua mientras consume este producto.

Efectos indeseables:

Diarrea (efecto dosis dependiente).

En pacientes con insuficiencia renal, puede ocurrir hipermagnesemia.

Posología y modo de administración:

Vía de administración oral.

Dosis como Laxante (tomar con un vaso de agua): Dosis máxima (toma única):

Adultos y niños mayores de 12 años de 2 a 4 cucharadas; niños de 6 a 11 años de 1 a 2 cucharadas; niños de 2 a 5 años, de 1 a 3 cucharaditas seguidas de un vaso de líquido; niños menores de 2 años: consulte a su médico.

Dosis como Antiácido:

Adultos de 1 a 3 cucharaditas, seguidas de un poco de agua hasta 4 veces al día o según indicación médica. No exceda la dosis recomendada.

Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción:

Los antiácidos interaccionan con drogas provocando alteraciones en el pH gástrico y formando complejos que no son absorbidos.

No administrar conjuntamente con productos que contengan tetraciclinas o compuestos de hierro.

Uso en Embarazo y lactancia:

No administrar si se encuentra en estado de embarazo o lactancia.

Efectos sobre la conducción de vehículos/maquinarias:

No se han reportado a la fecha.

Sobredosis:

Tratamiento sintomático. Medidas generales.

Propiedades farmacodinámicas:

ATC: A02AA04

Grupo farmacoterapéutico: Antiácidos, compuestos de magnesio.

El hidróxido de magnesio administrado por vía oral, reacciona rápidamente con el ácido clorhídrico del estómago para formar cloruro de magnesio y agua.

Propiedades farmacocinéticas (Absorción, distribución, biotransformación, eliminación):

Aproximadamente el 30% de los iones de magnesio se absorben en el intestino delgado.

Instrucciones de uso, manipulación y destrucción del remanente no utilizable del producto:

Recoja el recipiente para el reciclaje. El método de eliminación debe garantizar que no serán vendidos o utilizados nuevamente. Observe todas las regulaciones cuando elimine este producto.

Fecha de aprobación/ revisión del texto: 30 de junio de 2019.